

家有結核病患者 免心驚！

123 認識結核病
你我健康有保障

1 如何得知我有結核病？

許多患者在初期並無明顯症狀，易被忽略而延誤治療時機，因此，如出現咳嗽（2週以上）、發燒、食慾不振、體重減輕、倦怠、夜間盜汗、胸痛等症狀，建議及早就醫檢查。

2 傳染途徑有哪些？

空氣與飛沫傳染，一般規則服藥兩週幾乎無傳染力
可以放心的是，通常不會經由餐具、衣物傳染。

3 家有結核病患者該怎麼辦？

1. 除關心及鼓勵病人規則服藥外，居家保持通風，病人咳嗽、打噴嚏遮口鼻，咳出的痰液立即由馬桶沖走。
2. 如您被通知為病患的接觸者，不一定被感染，請勿擔心。請配合衛生單位進行後續檢查與追蹤。

結核病是可以痊癒的，只要遵照醫生指示，按時服藥六個月以上即可痊癒！



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

疫情通報及關懷專線：☎1922 <http://www.cdc.gov.tw>

你知道嗎？

潛伏結核 不會傳染 早期服藥 治癒率高

- ✓ 潛伏結核感染，尚未發病不具傳染力，接受潛伏結核治療可控制不發病。
- ✓ 一般人受到感染，一生中約有5、10%機率發生結核病，若有疑似症狀時應儘速就醫。

